ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

REBEL TOP

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

REBEL TOP - Composizione:
- Cyflufenamid . . . . . 5,1% (=51,3 g/litro)
- Coformulanti quanto basta a . . . . . g 100

Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea (H317); Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410); Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401); L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle (EUH066).

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102); Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270); Non disperdere nell'ambiente (P273); In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333 + P313); Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391); Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

Titolare di registrazione:
Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15448 del 22/06/2012

Officina di produzione:
Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria
SIPCAM OXON SpA, Salerano sul Lambro (Lodi), Italy

Taglie: ml 5-10-20-50-100-250-500
Litri 1-5-10

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto in formulazione EW (emulsione olio acqua), contiene Cyflufenamid, uno specifico fungicida antioidico per il controllo di varie specie di Oidio (Mal bianco).
Efficace contro oidio della vite da vino e da tavola (*Uncinula necator*), del melo (*Podosphaera leucotricha*) e delle drupacee (*Sphaerotheca pannosa)*.
Cyflufenamid è il capostipite della famiglia chimica degli Amidoxidimes, ed è dotato di un nuovo meccanismo d'azione.
Non manifesta fenomeni di resistenza incrociata con le attuali molecole chimiche antioidiche.
Il prodotto è dotato di una perfetta selettività nei confronti dell'artropodofauna utile, dei fitoseidi in particolare.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite da vino e da tavola: 40-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Uncinula necator*). Impiegare 8-10 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.
Intervenire in modalità preventiva indicativamente dall'inizio della fioritura (avendo utilizzato in precedenza prodotti antioidici specifici) fino ad ingrossamento acini ad intervalli di 10-14 giorni.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

Melo: 30-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Podosphaera leucotricha*).
Impiegare 9-15 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.
Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7-10 giorni dalle prime foglie espanse alla pre-raccolta.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

Drupacee (Pesco, Nettarine e Albicocco): 50-100 ml/hl per il controllo di oidio *(Sphaerotheca pannosa)*.
Intervenire in modalità preventiva a partire da dopo la fioritura fino alla pre-raccolta alla dose di 500 ml/ha. Se necessario, ripetere il trattamento con lo stesso prodotto (REBEL TOP) intervenendo non prima di 7 giorni.
Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà, aggiungere la quantità di prodotto necessaria con agitatore in movimento e quindi riempire il serbatoio.
Irrorare la vegetazione in tempi brevi dalla preparazione della miscela mantenendo l'agitatore sempre in movimento.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non ha mai manifestato effetti fitotossici sulle colture in etichetta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:
21 giorni per la vite; 14 giorni per il melo e le drupacee.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire il contenitore secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.06.2012 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 09.02.2025

ETICHETTA E FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

REBEL TOP

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

REBEL TOP - Composizione:
- Cyflufenamid . . . . . 5,1% (=51,3 g/litro)
- Coformulanti quanto basta a . . . . . g 100

Contiene 1,2-benzisothiazolin-3-one

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea (H317); Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410); Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401); L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle (EUH066).

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102); Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso (P270); Non disperdere nell'ambiente (P273); In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333 + P313); Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391); Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale vigente (P501).

Titolare di registrazione:
Sipcam Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 - 20123 Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15448 del 22/06/2012

Officina di produzione:
Kwizda Agro GmbH, A-2100 Leobendorf, Laaer Strasse/Kwizda Allee 1, Austria

SIPCAM OXON SpA, Salerano sul Lambro (Lodi), Italy

Taglie: ml 50-100

Partita n.:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 22.06.2012 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 09.02.2025